

Bezugsliste der pharmakologischen Gruppen von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden

I. Gruppen von Dopingwirkstoffen

- A. Stimulantien
- B. Narkotika
- C. Anabole Steriode
- D. Beta-Blocker
- E. Diuretika
- F. Peptidhormone und entsprechende Wirkstoffe

II. Dopingmethoden

- A. Blutdoping
- B. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation

III. Gruppen von Wirkstoffen, die bestimmten Einschränkungen unterliegen

- A. Alkohol
- B. Marihuana
- C. Lokalanästhetika
- D. Kortikosteriode

Beispiele

I. Gruppen von Dopingwirkstoffen

A. z. B. Stimulantien

Amfepramon	Koffein (Coffein) *)
Amfetaminil	Kokain (Cocain)
Amiphenazol	Mefenorex
Amphetamin	Methamphetamin
Benzphetamin	Methoxyphenamin
Cathin	Mehylephedrin
Chlorphentermin	Methylphenidat
Clobenzorex	Morazon
Chlorprenalin	Nikethamid
Cropropamid	
(Bestandteil von Micoren)	Pemolin
Crothetamid	
(Bestandteil von Micoren)	Pentetrazol
Dimetamfetamin	Phendimetrazin
	Phenmetrazin
Ephedrin	Phentermin
Etafedrin	Phenylpropanolamin
Etamivan	Pipradol
Etilamfetamin	Prolintan
Fencamfamin	Prophylhexedrin

*) Bei Koffein gilt die Probe als positiv, wenn die Koffeinkonzentration im Urin 12 Mikrogramm/ml übersteigt.

Fenetyllin
Fenproporex
Furfenorex

Pyrovaleron
Strychnin

und verwandte
Verbindungen

B. z. B. Narkotische Analgetika

Alphaprodin
Anileridin
Buprenorphin
Codein
Dextromoramid
Dextropropoxyphen
Diamorphin (Herion)
Dihydrocodein
Dipipanon
Ethoheptazin
Ethylmorphin

Levorphanol
Methadon
Morphin
Nalbuphin
Pentazocin
Pethidin
Phenazocin
Trimeperidin

und verwandte
Verbindungen

C. z. B. Anabole Steriode

Bolasteron
Boldenon
Clostebol
Dehydrochlor-
methyltestosteron
Fluoxymesteron
Mesterolone
Metandienon
Metenolon

Methyltestosteron
Nandrolon
Norethandrolon

Oxandrolon
Oxymesteron
Oxymetholon
Stanozolol
Testosteron *)
und verwandte
Verbindungen

D. z. B. Beta-Blocker

Acebutolol
Alprenolol
Atenolol
Labetalol
Metoprolol

Nadolol
Oxprenolol
Propranolol
Sotalol
und verwandte
Verbindungen

E. z. B. Diuretika

Acetazolamid
Amilorid
Bendroflumethiazid

Diclofenamid
Etacrynsäure
Furosemid

*) Bei Testosteron gilt die Probe als positiv, wenn die Verabreichung von Testosteron oder jede andere Manipulation dazu führt, daß das Verhältnis der Konzentration von Testosteron zu Epitestosteron im Urin höher ist als 6.

Benzthiazid
Bumetanid
Canrenon
Chlormerodrin
Chlortalidon

Hydrochlorothiazid
Mersalyl
Spironolacton
Triamteren

und verwandte
Verbindungen

F. Peptidhormone und entsprechende Wirkstoffe

Chorionisches
Gonadotrophin

Corticotrophin
Wachstumshormon

(HCG – menschliches
chorionisches Gonado-
trophin)
(ACTH)
(HGH, Somatotrophin)

II. Dopingmethoden

- A. Blutdoping
- B. Pharmakologische, chemische und physikalische Manipulation

III. Gruppen von Wirkstoffen, die bestimmten Einschränkungen unterliegen

- A. Alkohol
- B. Marihuana
- C. Lokalanästhetika
- D. Kortikosteroide

Anmerkung:

Bei dieser Liste handelt es sich um die vom Internationalen Olympischen Komitee im April 1989 angenommene Liste der Gruppen von Dopingwirkstoffen und Dopingmethoden.